La Desparasitació

Desparasitant-lo de paràsits interns i externs...

...també protegiràs a la teva familia!

Hostes indesitjables

- ✓ **Cucs, àcars, puces, insectes i altres** troben un lloc on prosperar en diferents parts del cos de les nostres mascotes: **són els PARÀSITS.**
- ✓ Els **paràsits** obtenen dels animals els nutrients que necessiten i poden transmetre **malalties.**
- ✓ Els **paràsits externs** o ectoparàsits viuen sobre la superfície dels seus cossos, com les **paparres, puces i mosquits** que s'alimenten de les descamacions de la pell o succionen la sang i **transmeten nombroses malalties.**
- ✓ Els **paràsits interns** o endoparàsits viuen a l'interior i s'alimenten de nutrients o sang, com per exemple la **tenia o altres cucs intestinals.**

Els Paràsits transmeten...

...nombroses malalties!

Tractaments disponibles

- ✓ **Pipetes** per a la pell amb substàncies repel.lents i que eliminen les puces, paparres, mosquits i mosques.
- ✓ **Collar antiparasitari** de diversos mesos de duració per puces, mosquits i paparres.
- ✓ **Comprimits**, **xarops** o **pasta antiparasitària** per cucs intestinals interns.
- ✓ **Especial atenció a la neteja acurada de la llar**, sobretot dels llocs on passa més hores la nostra mascota i, en cas necessari, aplicar **sprays** que destrueixen les puces adultes i les larves.
- ✓ **Bany antiparasitari.**

Encara que la teva mascota **visqui a la ciutat o només dins de casa**, **desparasita'l** de manera regular **tant a l'hivern com a l'estiu**.

Pauta recomanada a La Maquinista Veterinària

- **Desparasita'l una vegada al mes** per **puces, paparres i mosquits** i **cada tres mesos** per **cucs intestinals**.
- **Els cadells i gatets** s'hauran de desparasitar cada mes durant els sis primers mesos de vida.
- Els paràsits no solament son actius a **l'estiu**, també cal extremar les precaucions la resta de l'any ja que a l'interior de les cases es mantenen les **condicions ideals per a la seva reproducció**.
- **Natejar freqüentment el llit i accesoris** de la mascota i aplicar insecticides a la casa per eliminar ous i larves de puces aixi com no deixar que entri en contacte amb femtes d'altres animals.

Quins **paràsits** poden infestar a la teva mascota?

Puces

Les **puces** es situen sobre la **pell**, generalment a la zona dorsolumbar i **s'alimenten de la sang** de les nostres mascotes.

La seva picada:

- ✓ **Produeix molta irritació.** Això fa que l'animal intenti eliminar-les gratant-se o mossegant-se.
- ✓ **Pot produïr anèmia greu** al xuclar la sang d'animals joves.
- ✓ En animals molt sensibles provoquen una **greu alèrgia** cutània a la saliva de la puça, anomenada "Dermatitis Alergica a la Picada de Puça", amb lesions molt greus a la pell.
- ✓ Pot **transmetre** paràsits interns com la tenia Dipylidium, un cuc intestinal.

Les puces viuen a sobre de la pell del nostre animal, i **poden posar fins a 50 ous en 100 dies** per individu. Els ous que cauen a terra alliberen unes **larves** que **s'amaguen** a les catifes, sofàs o parquet de casa formant capolls invisibles a l'ull humà, dins els quals es formen **joves puces** adultes que saltaran a sobre del primer animal de sang calenta que passi pel seu costat per efectuar el seu primer àpat.

Paparres

Les **paparres s'alimenten de la sang** de les nostres mascotes a traves de la pell. S'enganxen amb molta força i poden:

- ✓ **Produïr molta irritació i ferides** amb pus degut a l'acció de l'animal a l'hora d'intentar treure-se-la.
- ✓ **Poden ser un gran perill** per a la nostra mascota ja que **transmeten paràsits sanguinis** que produeixen malalties tan greus com la **ehrlichiosi** o la **borreliosi de Lyme**, que poden arribar a **produir la mort**.

Les paparres viuen a l'exterior durant la primavera i l'estiu a arbres, herbes, matolls... i **s'enganxen principalment al cap i coll** dels nostres animals quan els treiem a passejar.

Algunes es poden desenganxar en arribar a casa i causar veritables **infestacions de la llar** que són difícils d'erradicar.

Quant s'eliminen és important que **no quedi cap part del paràsit dins la pell.**

Quins **paràsits** poden infestar la teva mascota?

Àcars

Poden afectar a diferents zones de la pell de l'animal.

Trobem:

- Els àcars que son exclusius de **l'oïda externa (Otodectes cynotis).**
- Els àcars que **viuen a la superfície de la pell** i que produeixen un determinat tipus de descamació i caspa.
- Els àcars que **viuen dins de la pell**:
  - La **sarna sarcòptica** (Sarcoptes scabiei)
  - La **sarna demodècica** (Demodex canis), que produeix lesions molt variades sobretot en animals amb el sistema immune débil.

Cucs intestinals

Poden aparèixer **cucs plans** com la **Taenia Dipilidyum** a l'ingerir puces o polls, o **cucs rodons** que es troben a les femtes dels animals en forma de larves infestants:

- Els cucs es localitzen a **dins dels budells** i s'alimenten de la sang i els nutrients que ingereix la nostra mascota. Des dels budells poden passar a altres òrgans com els **pulmons**, el **cor**, etc.
- Els **cadells són molt sensibles** a infestacions.
- Els cucs **són difícils de detectar a simple vista** i cal fer **anàlisis coprològiques** de manera habitual i periòdica per detectar-los.

El 28% dels gats a España té paràsits intestinals i el 16,6% dels que viuen a casa i no surten a l'exterior també.*

Mosquits

Uns **mosquits anomenats "flebotoms"** que són molt abundants a l'àrea mediterrània, poden picar al nostre gos injectant-li un paràsit que provoca una **malaltia molt greu, la Leishmaniosi canina**. Aquesta malaltia pot **acabar amb la vida del nostre** animal o necessitar medicació de per vida.

És possible el **contagi als nens i adults.**

Desparasita'l trimestralment contra cucs interns.

Evita la Leishmaniosi

- **Vacunant contra la malaltia** i/o amb tractament amb un **xarop inmunoestimulador**.
- **Evitar la picada** del mosquit utilitzant els **collars amb substàncies repelents.**

Però no existeix un tractament preventiu 100% eficaç.

*Font consultada: Bayer España.