

Pla vacunal del gat

La vacunació és clau en la prevenció de greus malalties



Què és una vacuna?

- ✓ Una **vacuna** conté petites quantitats de virus o altres patògens causants de malalties, a les quals se'ls ha reduït el seu potencial infectant.
- ✓ Quan s'administra, **estimulen el sistema immunitari del gat** per produir cèl·lules de defensa i anticossos que **protegirán contra una possible infecció**.

Per què hem de vacunar?

- ✓ Els gats vacunats amb regularitat **són menys susceptibles a tenir malalties infeccioses**.
- ✓ La **vacunació i una pauta de revisions de salut periòdiques** en els gats **augmenten la seva esperança de vida**.



I els efectes secundaris?

- ✓ Excepcionalment poden donar **reaccions adverses lleus** que desapareixen en poques hores.
- ✓ Possibles símptomes són **apatia i debilitat momentanis, pèrdua de gana, dolor lleu o inflamació** al punt d'injecció.
- ✓ El gat ha de trobar-se en un **estat de salut òptim i ben desparasitat en el moment de la vacunació** i seguir la pauta vacunal recomanada pel veterinari.
- ✓ Les vacunes fan que el risc de que emmalalteixin sigui molt més baix que si no estigués vacunat.

Per què vacunar al meu gat si mai surt al carrer?

Creure que si el teu gat no surt a l'exterior, està lliure de perill i no cal vacunar és un error.

Tingues en compte que:

- ✓ El teu gat **pot ser portador de virus** que provocarien malaltia si tingués una baixada de defenses.
- ✓ **Tot contacte puntual amb un altre animal** suposa un risc elevat.
- ✓ Nosaltres podem transportar en la **roba o les sabates microorganismes** amb capacitat infectant.

De què vacuno al meu gat?

A La Maquinista Veterinària establirem el **programa vacunal** més adequat per a cada gat segons l'edat, l'estil de vida i la zona on viu.

Les vacunes més recomanades

Panleucopènia Felina

Malaltia vírica molt contagiosa que **pot ser mortal**. Està provocada per un parvovirus summament resistent a l'entorn. **Els gats joves sense vacunar són els més propensos a patir-la.**

- ✓ **Síntomes:** debilitat, febre, vòmits, diarrees sanguinolentes, anèmia, leucopènia i deshidratació.
- La infecció apareix per la ingesta del virus a través del contacte amb objectes, persones o animals tacats amb les femtes infectades.
- ✓ **La seva vacunació és essencial en gatets de poques setmanes.**

Altres vacunes:

- ✓ Peritonitis Infecciosa Felina
- ✓ Clamidiassi felina
- ✓ Rabia



Pla vacunal a La Maquinista VETERINÀRIA

- ✓ **1ª dosi de la Trivalent als 2 mesos de vida (8 setmanes)**
- ✓ **2ª dosi: de la Trivalent als 3 mesos de vida (12 setmanes)**
- ✓ **Adults: revacunació anual**

Rinotraquetitis Infecciosa

Malaltia respiratòria molt contagiosa que pot arribar a causar la mort, o deixar seqüeles permanents. Pot ser causada per un calicivirus o un herpesvirus, que donen una clínica de estornuts, tos, conjuntivitis o fins i tot pneumònia bastant semblant.

- ✓ El contagi pot ser entre gats, o per secrecions a la nostra roba o en altres objectes.
- ✓ La vacunació contra el calicivirus i l'herpesvirus és essencial en gatets petits per prevenir el desenvolupament d'aquesta malaltia.

Leucèmia (FeLV)

El virus de la leucèmia felina està àmpliament estès entre els gats de tot el món i en els gats infectats persistentment origina una **greu depressió del sistema immunitari**. El retard en el creixement i el càncer són dues de les moltes alteracions causades per aquest virus, que **pot provocar la mort**.

- ✓ **Alguns símptomes:** febre, apatia, anorèxia, aprimament, inflamació de ganglis, possible càncer en cèl·lules sanguínies o òrgans interns, anèmia.
- ✓ **La vacunació disminueix el risc de contraure la malaltia i de que la clínica sigui greu.**

Vacunar cada any és fonamental...

...per augmentar la seva esperança de vida